


J. A. Bontros

Sans indication de l'année

Prix Menier 1889 (1)

1889



J. A. Boutron.
(2^e année).

Des Légumineuses contenant Des produits toxiques.

La famille si considérable des Légumineuses
fournit à l'alimentation, à l'industrie, à la thérapeu-
tique des produits aussi nombreux que variés. Les
services qu'elle nous rend sont immenses.

L'alimentation y puise ses denrées les plus
précieuses et on peut dire que presque toutes nos
légumineuses indigènes sont aptes, certaines d'autre
elles presque indispensables même, à la nourriture du
bétail. Plusieurs espèces, la luzerne, le trèfle, le
sainfoin, sont surtout cultivées spécialement pour
cet usage.

C'est qu'en effet ces plantes sont essentiellement

nutritives. Elles ont pour rôle important de fixer l'azote de l'air et on trouve dans les cotyledons de leur graine, en quantité notable surtout dans les semences comestibles, une matière azotée particulière la Légumine, qu'en raison de l'analogie de propriétés et de composition qu'elle présente avec la caséine M. Lischaf avait appelée matière végétale animale des légumineuses et M. Liebig, caséine ou caséum végétal.

Comme le gluten, cette substance contient une certaine proportion de soufre. D'après M. M. Dumas et Cahours, elle est formée par un principe immédiat spécial renfermant moins d'azote et plus de carbone que la caséine du lait. Elle joue le rôle d'acide: se combine aux alcalis et à différents sels. Elle est notablement soluble dans l'eau et les acides minéraux l'en précipitent, ainsi que l'acide acétique. Ce dernier sert à la préparation: on fait une solution filtrée de cette substance au moyen d'une macération faite pendant plusieurs semaines pulvérisées et on précipite la légumine en ajoutant avec précaution

l'acide acétique. C'est en raison de ces propriétés
aides que, dans une eau crue, on la voit former
avec les sels de chaux qui y sont dissous un composé
calcaire insoluble à la surface de la graine, dont
la croissance ultérieure est alors arrêtée.

Quant à l'indigotée, elle appartient aussi
à cette famille beaucoup d'importants matériaux,
tous des plus utiles, principalement pour la teinture
des étoffes et l'ibimistère

Enfin, la matière médicale y compte une
foible de médicaments de propriétés très-diverses; les
uns, et c'est le plus grand-nombre, purgatifs à des
degrés différents, d'autres émétiques, vermifuges,
astringents, etc., etc.

Parmi les produits de cette famille qui concernent
plus spécialement la pharmacie, nous devons dis-
tinguer ceux qui présentent un degré de toxicité
plus ou moins élevé.

Cette famille, dans laquelle on n'est guère
habitué à voir figurer que des produits utiles

renferme cependant un nombre assez considérable
de substances vénéneuses qui, en raison de leur
action physiologique toute spéciale, méritent une
place à part parmi les produits vénéneux de la
matière médicale.

Certains de ces poisons, tels que le
Phyostigma et l'*Erythrophloeum* sont des poisons violents
qui sont connus parmi tous les poisons végétaux.
D'autres sont moins dangereux à doses tout-à-fait
minimes, mais peuvent le devenir s'ils sont ingérés
ou introduits dans la circulation à des doses rela-
tivement faibles. Ils méritent donc d'être signalés.

D'une façon générale, en outre de l'action
spéciale qu'exercent sur le cœur presque tous les
produits nettement toxiques de cette famille, ce
sont des drastiques plus ou moins violents, l'essen-
ce faite bien entendre pour d'autres propriétés par-
ticulières qu'ils peuvent en outre posséder.

Nous avons laissé presque entièrement de
côté, dans le présent travail, la partie histologique

Sujet, bien que nous sachions que cette partie de
l'histoire de ces substances ont été pour plusieurs
d'entre elles un plus grand intérêt. Nous avons pris
pour rôle plus modeste de présenter une sorte
d'histoire aussi rapide et aussi complète que possible,
de chacune des substances de cette famille auxquelles
les physiologistes ont reconnu des propriétés toxiques.
Plusieurs qui étaient restées longtemps dans l'ombre
se sont montrées récemment avec des propriétés
jusqu'alors ignorées chez elles. D'autres sont entière-
ment nouvelles et ont été mises plus ou moins en
relief après des séries d'essais thérapeutiques.

Quoique dans notre pays on ne fasse guère
qu'en signaler l'existence, elles ont cependant
donné lieu à l'étranger à de nombreux et impor-
tants emplois, notamment en Angleterre et en
Amérique. Aussi, avons nous puise dans les
journaux de Pharmacie de Philadelphie et de
Londres beaucoup des renseignements qui nous
étaient utiles. Nous avons surtout tenu à donner

une Description aussi fidèle que possible de substances
vénéneuses de cette famille utilisées en matière médicale
et de leurs effets toxiques et, pour les plantes qui par
leur importance nous semblaient le mériter, nous en
avons donné, avec les auteurs, la monographie.

Nous croyons logique de ranger les
végétaux qui vont nous intéresser selon leur ordre
botanique. Nous suivons pour cela la méthode de
classification de De Candolle, quoique celle beaucoup
plus récente de M. M. Bentham et Hooker soit actuel-
lement adoptée; mais, au point de vue restreint
où nous nous plaçons, elle est très-suffisante et
s'offre d'ailleurs avec la plus grande clarté.

D'après cette méthode, la famille, ou plutôt
la classe des Légumineuses se trouve divisée d'abord
suivant la disposition de l'ovaire, courbé ou droit,
en deux sous-groupes, lesquels se subdivisant ensuite
en quatre familles, Papilionacées, Swartziacées,
Mimosacées, Caesalpiniciées, formant onze tribus, d'après
des caractères tirés de la disposition de la corolle,

puis des cotylédons, des fruits, etc., etc. Nous laissons
à côté des *Sorartiques*, des *Ditaniées* et des *Geoffroyés*
qui ne nous fournissent aucune plante intéressante,
ni même aucun produit à la matière médicale.
Il nous restera ainsi à considérer les huit tribus
suivantes: *Sophorées*, *Sotés*, *Hedysarées*, *Viées*,
Barbélées, *Salbergiées*, *Mimosées* et *Caspiées*.

Lapilionacées.

§1. *Sophorées*.

Dans cette tribu qui fournit à la matière
médicale les Baumes de Seron et de Coton, se
place le genre *Anagyris*, qui n'a d'ailleurs chez nous
qu'une seule espèce l'*Anagyris foetida* L.

C'est un arbuste qui croît dans les lieux
arides de toute la zone méditerranéenne (Provence,
Algérie, Espagne). Son bois et surtout son écorce
ont une odeur fétide lorsqu'on le froie, d'où son
nom spécifique et celui de Bois puant qui lui
a été donné dans le midi de la France. Cette

mauvaise odeur se développe même simplement en agitant le rameau de la plante, d'où le proverbe grec "Secouer l'Anagyris", qui voulait dire rappeler à quelqu'un une histoire désagréable.

Autrefois, on en employait le bois comme emménagogue, les feuilles comme résolutive et les graines comme vomitives. Pendant longtemps ses feuilles ont été à Chypre et en Grèce d'un usage populaire comme faux séné. Les graines sont en effet vomitives mais elles sont toniques. C'est une éméto-cathartique violent, dont on ne pourrait se servir qu'avec la plus grande prudence.

Sennarola en 1851 avait trouvé dans ces graines de l'insuline, un principe purgatif et une huile âcre.

En 1870 M. Arnould fit, avec leur extrait, des expériences physiologiques et il constata, à dose toxique, des vomissements, frissons et tremblements, l'abolition de mouvements musculaires, le ralentissement de la respiration, puis son arrêt et enfin l'arrêt du cœur.

Le dernier jour, M. le Dr Reale, par un

mémoire publié en 1887, annonce qu'il en a retiré
un alcaloïde qu'il appelle anagyrine, auquel il
assigne pour formule $C^{22}H^{34}N^{10}$, amorphe, insol.,
hygroscopique et très-amer, donnant avec les
acides des sels ne cristallisant pas, à l'exception
du sulfate qu'il obtient cristallisé en aiguilles
en forme de feuilles de fougères.⁽¹⁾

Mais il résulte d'un travail publié en
1887 à la Société de biologie que la priorité de
cette découverte revient à M. M. L. Hardy et
H. Gallois.⁽²⁾

Ils en ont en effet isolé l'anagyrine
d'une façon complète, en ont reconnu la fonction
alcaloïdique et déterminé la formule qui répond
au symbole $C^{44}H^{18}N^{20}$, et, contrairement à M.
Reale, en ont obtenue des sels toujours très-nette-
ment cristallisés. Voici d'ailleurs leur mode de
préparation :

« On met les grains concasés en macé-
ration dans l'eau froide, on précipite par l'acétate de

(1) American Journal of Pharmacy. an. 1888 p. 237.

(2) Journal de Pharm. et de Chimie. Janv. 1889, p. 14.

« plomb; on entre l'excès de ce dernier par l'hydrogène
« sulfuré. On concentre et on précipite par le bichlorure
« de mercure. On décompose le précipité mis en suspension
« dans l'eau par l'hydrogène sulfuré; on évapore, on
« ajoute à la solution du carbonate de potasse et
« on agite à plusieurs reprises avec du chloroforme.
« Celui-ci est agité à son tour avec l'acide chlorhy-
« drique très-étendu. La solution évaporée donne le
« chlorhydrate d'anagyrene cristallisé. On dissout
« celui-ci dans l'eau, on le décompose par le
« carbonate de potasse et on agite avec du l'alcool.
« On sature ensuite l'alcool décanté par un courant
« d'acide carbonique qui précipite la potasse et la
« solution filtrée fournit par évaporation l'anagyrene,
« qu'il suffit de reprendre par l'alcool absolu pour
« obtenir pure. »

C'est un alcaloïde amorphe, jaunâtre,
soluble dans l'eau, l'alcool, l'éther, devenant visqueux
à l'air libre à cause de son hygroscopicité et formant
avec les acides des sels bien cristallisés.

M. M. Hardy et Gallois en ont encore obtenu le chlorhydrate ($C^{14}H^{18}K^2O^2, HCl + 4H^2O^2$) sel blanc gris cristallisant en houppes toyeuses étirées ou en tablettes rectangulaires biseautées, très-soluble dans l'eau et le chloroforme, moins soluble dans l'alcool, peu dans l'éther, devenant anhydre à 127° . Ils ont obtenu aussi des chlorhydrates doubles d'anagyrisine et de platine, d'anagyrisine et d'or cristallisés.

L'anagyrisine est un poison violent, M. Bochefontaine et M. Gley ont fait sur des animaux une série d'essais physiologiques et ils ont eu des résultats fort analogues à ceux de M. Arnoult. Chez les grenouilles, la paralysie est complète, et les battements du cœur persistent longtemps après que les autres mouvements ont cessé.

Nous mentionnerons sans nous y arrêter une nouvelle plante dont on n'a pas encore annoncé de propriétés thérapeutiques spéciales, le Sophora speciosa Pursh, mais dont les semences sont, d'après M^r. Bellinger du Texas, employés par les

Indiens des environs de San Antonio comme
intoxicant. La moitié d'une graine suffisait,
paraît-il, pour déterminer un sommeil pouvant
se prolonger deux ou trois jours et on assure
qu'une graine entière est suffisante pour tuer un
homme. Cette plante a donné lieu d'ailleurs à la
découverte d'un alcaloïde toxique.

Le *Sophora speciosa*, dont M. M. Moritz
Kaltzer et W. Neil ont donné une description et un
descriptif très détaillés, ainsi qu'une étude chimique
complète, ⁽¹⁾ est très abondant du Texas et du Nouveau-
Mexique pouvant atteindre jusqu'à trente pieds de
haut qui croît surtout dans les terrains rocailleux
de ces contrées. Son bois est jaune, dur et très-bois
à l'écorce mince d'un gris brun. Les semences, qui
renferment le principe vénéneux et que, pour cette raison
on a nommées fèves-poison (poison beans) servent ap-
prais de billes à jouer aux enfants. Elles sont ovales
arrondies, à testa dur, granuleux, rouge foncé ou
jaune, indolores, un peu amères.

(1) Amer. Journ. of Bot. an. 1936 p. 461 et suiv.

Le Dr. Wood, en 1878, a retiré de l'extrait fluide
de ces graminées alcaloïdes toxiques, la Dophrine,
dont M. M. Katterer et Neil ont ensuite constaté
la présence dans le tartre et dans l'amande, en
moins grande proportion, semble-t-il, dans cette
dernière partie. Elle n'a pas encore été l'objet
d'observations physiologiques.

L'écorce d'alcornoque, qui provient
d'un bel arbre à bois dur originaire du bassin de
l'Orénoque, le Bondichia virgatioides H.K., est une
émétique puissante qui produit des effets analogues à
ceux de l'Spécacua. Elle n'est pas employée chez
nous, mais elle pourrait à la rigueur le remplacer;
elle contient un principe, vraisemblablement toxique,
analogue à l'émétine, observé par Biltz, Frenzel (1883),
et Spryatis (1871).⁽¹⁾

À la suite de ce Bondichia, nous croyons
devoir signaler le Bondichia major Moer., grand arbre
du Brésil, dont le bois très-dur est principalement
employé là-bas pour l'exécution de travaux nous-mêmes.

(1) Ann. Journ. of Hyg., an. 1886 p. 613

et qui semble devoir être appelé à jouer un certain rôle
en thérapeutique.

Ce produit arrive depuis peu dans le com-
merce européen sous le nom D'écorce de Sincupira
(*Sincopira*, *Soucoupira*, *Helipira* guari). Cependant M. le Professeur
Ranchon rapporte cette dernière écorce au genre *Peroba*.
C'est un médicament usité depuis fort longtemps au
Brésil, où il est tout-à-fait populaire comme épuratif,
fébrifuge et antirhumatismal et qui était resté jusqu'à
présent à peu près ignoré en France.

Cette écorce se présente en fragments durs et
épais, d'une couleur jauneocre, la faisant un peu
ressembler aux quinquinas jaunes. Elle paraît être un
bon diurétique.

M. Letit en a isolé un Alcaloïde dont d'une
action stupéfiante et mydriatique qui semble indiquer
de la part de cette substance une toxicité relative⁽¹⁾.
Et M. Beckolt en 1876 en a retiré de son côté un glucoside
cristallisable qu'il a nommé Soucoupirine (*Sincopirine*),
dont les propriétés physiologiques n'ont pas été examinées.

(1) Journ. de Pharm. et de Ch. an. 1885 t. XII p. 186.

(2) Les Nouv. Remèdes. an. 1885 p. 124.

(3) Amer. J. of Pharm. an. 1886. p. 613.

Une sophorée qui présente encore une certaine toxicité, c'est le Baptisia tinctoria R. M. (*Sophora tinctoria* L. *Bodalyria tinctoria* W.). La racine de cette plante est utilisée depuis peu par l'industrie tannante. Dans l'Amérique septentrionale où la plante est assez commune dans les terrains sablonneux, on la connaît sous les noms d'herbe au Kaoy, ou Indigo sauvage. La racine, (*wild indigo root*) contient effectivement une matière colorante analogue à celle produite par les indigotiers et fournissant une sorte d'indigo vert à reflets bleus. Cet indigo nous arrive de Cochinchine.

Les racines et les feuilles de *Baptisia tinctoria* sont fortement vomitives. Si à une solution alcoolique provenant d'une macération de ces racines on ajoute une certaine quantité d'eau, il se précipite une résine jaune que l'on connaît sous le nom de Baptisin ou Baptisine. Ce médicament, qui fait partie de la pharmacopée des États-Unis, est très-virile la-bas comme astringent, antiseptique, astringent, emménagogue, irritant. Il possède à un haut degré

toutes ces propriétés. La dernière surtout est remarquable à la dose de 5 ou 6 centig. en effet, le baptisin fait vomir. Les doses habituelles sont comprises entre 0.03 et 0,10 centig.

C'est aussi un cathartique violent. Il est employé à petites doses dans la fièvre typhoïde et les maladies putrides de la gorge.

D'après le Dr von Schroeder, l'extrait dans cette racine trois principes différents: 1^{er} un glucoside amer, insoluble dans l'eau, sans action physiologique marqué qu'il appelle le Baptisin; 2^o un autre glucoside soluble dans l'eau, cristallisant en aiguilles et légèrement purgatif qu'il nomme Baptin; 3^e enfin un alcaloïde toxique, même à petite dose, la Baptitoxine qui produit chez les animaux à sang chaud un ralentissement de la respiration, avec accroissement de l'irritabilité réflexe de la muqueuse.⁽¹⁾

La résine Baptisin seule jusqu'à présent offre un certain intérêt thérapeutique.

(1) Pharm. Journ. and Transacting - an. 1905-06. t. 16. p. 366.

§2. Lotees.

Cette tribu en, avec elle des Caspiens, celle qui fournit le plus grand nombre de produits à la matière médicale. La Bugrane, la Rigliste, le Melilot, le Fenugrec, l'Indigo en font partie et beaucoup d'autres médicaments exotiques. On y trouve aussi les Astragales, ainsi qu'une grande variété de bois plus ou moins recherchés par l'ibénistère.

Les espèces dits Genêts appartiennent à différents genres de cette tribu :

Celui appelé improprement Genêt d'Espagne est le Spartium junceum L. (Genista juncea Lam.)

Le Genêt des teinturiers (Genette, Genestolle) qui n'est à l'aimement employé contre la rage, est le Genista tinctoria L. On en mange, paraît-il, les boutons confits dans le vinaigre.

Le Genêt purgatif appartient au genre Sarothamnus, le S. purgans S.S. (Genista purgans Lam.)

Il en est de même du Genêt à balais qui est le Sarothamnus scoparius Koch (G. Scoparia Lam. Spartium).

Scoparium L. *Cytisus scoparius* Link.)

Ces quatre plantes ont des propriétés médicales un peu près semblables. Elles sont depuis longtemps réputées purgatives, éméto-cathartiques et diurétiques. D'ailleurs peu-usitées. Toutefois les semences de *Scoparium juncea* sont très-irritantes et, au point de vue de l'action diurétique le *Sarothamnus scoparius* possède des propriétés bien spéciales.

Le *Sarothamnus scoparius* en effet est tonique et alimentaire pour les bestiaux qui en recherchent les fleurs, les fruits et les jeunes pousses. Cependant l'on a remarqué que s'il est pris par eux en trop grande quantité, il détermine (surtout son fruit), un profusement de sang particulier qu'on a nommé pour cette raison, gênerade, ce qui montre qu'il pourrait devenir dangereux. U, en effet, nous allons voir plus exagérée encore cette action diurétique avec le *Scoparium*, l'un des principes actifs isolés de ce *Sarothamnus*. Malgré cela, cette plante est assez estimée dans certaines contrées comme aliment d'hiver du bétail.

Stenhouse a retiré des fleurs de ce Scoparium
une matière colorante jaune, cristallisée en groupes
étoilés, peu soluble dans l'eau froide, très-soluble dans
l'eau bouillante et l'alcool, inodore et insipide,
assez fixe, c'est la scoparine ($C^{42}H^{22}O^{20}$) hydrate de
carbone, transformable en acide picrogène sous l'influence
de l'acide azotique. Elle ou peu utilisée encore en
thérapeutique, elle représente cependant le principe
picrogène de la plante et son action dans ce sens doit
être très-énergique. Elle peut se prescrire à la dose
de 0.25 à 0.50 centigrammes.

Stenhouse y découvrit encore un
alcaloïde, la spartéine ($C^{30}H^{26}N^2$) dont M.
Gerhardt et Mills en 1863, puis M. Kossé en 1885, ont
donné d'autres procédés de préparation. C'est un
principe huileux et incolore, possédant une odeur
faible qui rappelle un peu celle de la pyridine, plus
dense que l'eau, bouillant à 287°. Elle est peu
soluble dans l'eau; soluble dans l'alcool, l'éther,
le chloroforme; insoluble dans la benzine et les huiles de

pétrole. Elle brunit lentement sous l'action de l'air et propose une réaction fortement alcaline. Ses sels cristallisent mal. Elle est vénéneuse.

L'empoisonnement avec cette substance se manifeste par des tremblements d'abord; le malade titube, il a des convulsions au moindre contact et est dans l'impossibilité de se mouvoir. Les mouvements de la respiration sont d'abord gênés, puis paralysés et les battements du cœur, primitivement accélérés, se ralentissent (période d'excitation) puis s'affaiblissent de plus en plus jusqu'à l'arrêt complet (période de collapsus). Enfin la mort arrive dans les convulsions de l'asphyxie. D'après Mitchell vingt-cinq centigr. de sparteine suffisent pour tuer un lapin.

Des expériences cliniques nombreuses ont été faites durant ces dernières années avec ce sulfate principalement. Il résulte que la quantité d'urine émise augmente peu ou pas du tout; mais on constate surtout, chez certains cardiaques, une atténuation des palpitations du cœur très-remarquable, une princip.

lement, d'après M. Hans Voigt de Vienne, a ce que a tel
possède la propriété d'augmenter l'énergie des
contractions, tout en les accélérant et surtout en
les régularisant. On voit à cet effet (ce M. H. Voigt en
d'accord, et cela avec les nombreux médecins qui ont
étudié presque simultanément la question) la puissance
à petites doses variant de 1 à 4 millig., dont on peut
sans danger répéter l'administration, même durant
toute une semaine. Les résultats de ces essais à faibles
doses se trouvent vérifiés et complétés non seulement par
les études de M. H. Voigt de Vienne, mais encore par celles
du D.^r Ghezinski qui a obtenu des effets très analogues,
par celles de M. G. Sée qui a porté parfois la dose
jusqu'à 0.07 et 0.20 centig sous forme de pilules ou potions
et par les expériences encore absolument concordantes de
M. M. Labrosse et Lignès.

Enfin M. M. Grandral et Salser, professeurs à
l'école de médecine et de pharmacie de Reims, ont fait une
étude très approfondie de ses différents sels que nous
n'avons pas à résumer ici.

Ce sel peut dans certains cas remplacer la digitale, quoiqu'il soit moins actif qu'elle & se provoque pas de nausées comme cette dernière et est très-facilement tolérée par le tube digestif. De plus, et c'est son grand avantage, ses effets sont très-rapides. Au bout d'une heure généralement ils apparaissent et peuvent persister jusqu'à 24 heures et même pendant trois à quatre jours, d'après M. G. Lel. D'ailleurs, la sparteine est rapidement éliminée par les urines et le peu de danger qui résulte parfois de son emploi ne persiste jamais.

Le sulfate de sparteine est soluble dans l'eau. Comme la sparteine elle-même, il est très-toxique. A doses minimes, 0.1/ centig. même, il n'agit pas très-sensiblement sur un homme bien portant; mais 0.30 centig. déjà, pris en une seule fois, produisant des vertiges, des éblouissements, maux de tête, palpitations et des fourmillements dans les membres. Une dose de 0.10 centig. suffit pour produire, chez des individus atteints d'affections du cœur, des effets semblables on

peut sans danger en porter la dose quatorzième jusqu'à
0.07, 0.10 et même 0.25 Centig. C'est donc un
médicament purgatif, appelé à occuper une place
importante en thérapeutique⁽¹⁾.

Parmi les espèces du genre Cytisus, beaucoup
sont vénéreuses et elles ont toutes en général des pro-
priétés purgatives.

Nous croyons devoir résumer ici, à ce sujet,
les importants travaux de M. Ch. Cornier, présentés en
1886 à l'Académie des sciences.

M. Ch. Cornier, étudiant comparativement au
point de vue toxicologique dix espèces de Cytisus
différentes, en trouve deux seulement douées de
propriétés vénéreuses (les Cytisus scrofolius et C. capitatus),
deux autres étaient légèrement (C. nigricans, C. supinus).
Enfin les six autres accusaient une action extrêmement véné-
reuse; ce sont les C. laburnum, C. alpinus, C. purpureus,
C. Weldenii, C. biflorus, C. elongatus. Chez ces derniers, la principe
toxique existe absolument dans toutes les parties de la
plante. Mais spécialement, (surtout celle de la racine), les fleurs

(1) Les Nouv. Rem. an. 1881 p. 31 - an. 1886 p. 11, 149, 251, 226 - an. 1887 p. 23, 216
317, 350 et Journ. de Ph¹ et de Ch. an. 1886 t. XIII p. 39; t. XIV p. 65, 77.

et les graines en contiennent toujours une plus forte proportion, car, les feuilles et les gousses abandonnent petit à petit à ces parties, destinées à subsister la dernière, le poison qui elles contenaient en grande quantité au commencement de leur croissance et dont elles ne possèdent plus que des traces lorsque leur rôle physiologique est terminé.

Des expériences nombreuses et minutieuses auxquelles s'en livre M. Ch. Cornu avec des extraits aqueux ou alcooliques de ces plantes, il conclut, si les Cytises sont absorbés par les voies digestives, à leur action toxique sur presque tous les animaux à sang chaud, exceptés les ruminants et les rongeurs, qui de même que les porcs, semblent y être réfractaires. Un puissant effet émétique permettant d'ailleurs aux animaux susceptibles de vomir de résister plus longtemps au poison. Par injection hypodermique, tous sont tués. A petite dose, est. S. l'extrait de Cytise est un excitant. A dose toxique, on observe en outre une période de coma, avec incoordination des mouvements, nausées et vomissements, à laquelle

Incidents de la chorée, des convulsions, des crampes, en même temps que la température centrale augmente. L'apnée, la mort survient par arrêt de la respiration et du cœur. Si l'on donne de suite une dose toxique de fœtus à ce qu'il n'y ait pas d'élimination par les reins, le poison se localise spécialement dans le cerveau.⁽¹⁾

Le Cytisus alpinus mill. ou Cytise des alpes a été un purgatif employé dans certaines contrées; mais c'est un médicament peu sûr, plutôt dangereux. Nous venons de voir en effet qu'il contient le principe vénéneux des Cytises ou Cytisine en quantité suffisante pour nécessiter la plus grande prudence.

Le Cytisus laburnum L. ou Faux ébénier (Cytise à grappes, Bois de lièvre, autois, arbois) est un arbre de trois à six mètres de hauteur, dont le bois est dur et de couleur foncée, ce qui lui a valu le nom de faux ébénier. On le rencontre à l'état spontané dans les bois de l'Est et en Provence, mais il est cultivé communément presque partout comme plante d'ornement, à cause de ses longues grappes de fleurs jaunes d'un très-

(1) Journ. de Ph. et de Ch. an. 1886 t. XIII p. 522.

bel effet et il est presque spontané dans les environs
de Paris. Ces fleurs qui, à part la couleur, ont une
assez grande ressemblance avec celles de *Robinia pseudo-*
acacia, ont pu être parfois confondues avec elles pour
la préparation de certains baignets et donner lieu
à de très-graves accidents.

D'assez nombreux cas d'empoisonnement
sont présentés, surtout en Angleterre, certains suivis
de mort⁽¹⁾

Différents auteurs ont signalé et décrit les
effets toxiques du *Cytisus laburnum*, M. M. Housman et
Manné entre autres et M. Ch. Cornu dont nous avons
esquisse un peu plus haut les travaux.

De leur côté en 1886 M. M. Révot et P. Pinaud
ont repris sur des animaux une série d'expériences
avec des infusions préparées, soit avec les feuilles, soit avec

(1) I. Deux cas d'empoisonnement mortels par le faux ébénier dans le
Yorkshire, sur deux petites filles de trois et huit ans, mortes, la première 14
heures, l'autre 40 heures après l'ingestion du poison. On ignore la partie du
végétal absorbée. (Journ. de Bot. et de Ch. an. 1882 t. VI, p. 204)

II. Commencement d'empoisonnement en Angleterre sur plusieurs
enfants par la racine du *Cytisus laburnum* (Pharm. et Journ. and Transact.
an. 1885-86, t. 16 p. 1024).

III. Commencement d'empoisonnement sur trois enfants dans l'oxford
par les graines du *Cytisus laburnum* (Americ. j. of Bot. an. 1888, p. 268).
etc. etc.

les fruits, soit enfin avec des extraits alcooliques ou aqueux
des graines desquelles. Voici les conclusions générales aux-
quelles ils sont arrivés:

" L'extrait aqueux est plus actif que l'extrait
alcoolique.

" La Cytise doit être considérée comme un
bon vomitif, à action centrale, agissant rapidement et
mieux par injection hypodermique que par ingestion
stomacale.

" A l'action vomitive se joint, à haute dose,
une action paralyto-motrice analogue, si ce n'est identique,
à celle que produit le curare.⁽¹⁾

Dans tous les cas, nous en devons conclure
que c'est un vomitif violent qu'on ne saurait administrer
que prudemment. D'ailleurs, un cas d'empoisonnement
de trois enfants qui eurent l'imprudence d'en manger
les fruits et rapport dernièrement par la "Revue des
Sciences médicales de G. Hayem, signale, pour deux d'entre
eux qui ne purent être saisis les symptômes suivants:
crampes aux extrémités inférieures, vomissements sanguinolents,

(1) Journ. de Méd. et de Ch. an. 1887, t. XVI, p. 461.

perle de l'intelligence et de la parole, convulsions et la mort; leur durée: une heure au plus. Ce qui se rapporte à peu près aux symptômes observés chez les animaux par M. Ch. Comenay et par M. M. Péron et Brind. Le troisième enfant qui n'en avait pas absorbé les graines, put être sauvé.

Ces graines renferment en effet un principe amer, non agoté; inusuellement toxique, auquel M. M. Chevalier et Lafaigne qui l'ont découverte et étudiée ont donné le nom de Cypisine. Elle qu'ils l'ont obtenue c'est-à-dire à l'état impur, c'était une substance de couleur blanc-jaunâtre, amère, ressemblait un peu à la gomme arabique; deliquescente, soluble dans l'eau et l'alcool aqueux. Si on se introduit quelque légèrment dans la circulation d'un fort chien par injection hypodermique on détermine la mort de l'animal par asphyxie Elle quelques analogies avec l'émétine. A l'intérieur elle fait vomir et purge à la dose de 10 à 20 centigrammes seulement, elle présente alors un peu les caractères de la cathartine, principe purgatif des sécr. Quarante centigrammes de ce produit purifié détermine déjà

de violents effets : vertiges, spasmes, convulsions, vomissements, etc., etc..

Elle a été tout dernièrement préparée à l'état de pureté par M. M. Husemann et Marmé. Au moyen de manipulations assez compliquées, ils obtiennent des cristaux d'azotate de cystéine dont ils séparent ensuite la Cystéine par la potasse concentrée, etc. (1) On a ainsi des cristaux de saveur amère, puis caustique, soluble dans l'eau et l'alcool et dormant avec les acides des sels très cristallins.

La Cystéine ainsi préparée pure, jouit de propriétés physiologiques incomparablement plus énergiques que la Cystéine amorphe. C'est un toxique violent, déterminant aussi des vomissements, puis la mort par asphyxie. Malgré cela, elle a été employée l'année dernière avec succès par M. Krapelin dans un cas compliqué de migration chez une hystérique : une injection hypodermique de 0.003 mg. de son nitrate obtint un bon effet immédiat. Absorbée à l'intérieur, elle ne produit-il pas l'autre effet que des vomissements. La dose peut ainsi en être portée jusqu'à 0.01 mg. Mais, jusqu'à présent,

(1) Préparation de la Cystéine. Nouv. Rem. au. 1889 p. 251.

son emploi ne semble devoir être que très restreint.

Les fleurs blanches et odorantes du
Robinier, Robinia pseudo acacia L., arbre américain,
si commun maintenant en France tout, nous l'avons
déjà dit, utilisés pour aromatiser certains mets. Elle
est inoffensive. La racine est vomitive; quelque fois
employée. Quant à l'écorce légèrment astringente du
bois, elle est relativement vicienneuse.

Un cas d'empoisonnement par cette substance
est signalé en 1887 par le Dr B. Emery de Brooklyn.⁽¹⁾ Deux
enfants de l'orphelinat de cette ville furent atteints.
M. Emery semble incriminer la partie interne seule
de l'écorce. Il rapporte que chez ceux qui furent le plus
épargnés, il y eut quand même des vomissements sanguins,
la face devint rouge, la gorge sèche et la pupille se dilata.
Chez les autres, les matières vomies étaient en outre sangui-
nolentes, les efforts plus rapprochés avec sensation de
douleur à la région épigastrique; sébille, stupeur,
engourdissement des extrémités inférieures, pouls presque
imperceptible, ballonnement du cœur violent et intermittent.

(1) Amer. J. of Ph., an. 1887, p. 1/3.

terre, dilatation de la pupille et pâleur de la face. On
somme, les caractères d'un poison cardiaque. On pres-
crit deux jours à se remettre. On leur administre comme antipode
le sous-carbonate de bismuth, en même temps qu'on leur
fait des injections hypodermiques de morphine.

Le *Galega officinalis* L. (Laurier, Rue de Chèvres ou
Rue d'Indigo) a été longtemps réputé très-energique comme
sudorifique et lactifère et, dans certains localités, cette
est même considérée par le vulgaire comme susceptible
d'accroître la sécrétion du lait et parfois, dans ce
but, cultivée comme fourragère. Elle est susceptible
de produire l'indigo et non vénéneuse, mais dans ce
même genre *Galega*, il faut citer le *Galega toxicaria*
M. de l'Inde et le *Galega sericea* Humb. ex. Artillerie, qui
possèdent des propriétés inébranlables remarquables. Ils
servent dans ces contrées à empoisonner les poisons. Ils
ne les rendent cependant pas vénéneux à manger, à qui
tient sans doute à ce que ce principe débilement est, comme
beaucoup d'autres poisons végétaux, solatilisés par la
cuisson. Le *Galega sericea* est encore comme médicament.

externe, en application sur les morsures d'animaux
venimeux

Le genre voisin Cepbrodia, dans lequel
d'ailleurs, certains auteurs ont rangé le Galaga et. desps,
comprend aussi plusieurs espèces à propriétés très-énergiques.
Dont quelques unes se sont parfois rencontrées comme falsi-
fication dans le sein de Brépoli.

Les graines de Lupin contiennent un principe
toxique qui a récemment été mis en évidence par plusieurs
expérimentateurs. La farine du *Lupinus albus* L. faisait
partie avec celle de fougrec, de fève et d'orobe, des quatre
farines résolitives des anciens codex. Les graines de Lupin
sont amères, mais cette amertume est détruite par la cuisson,
car elle est due à un principe âcre et délétère volatilisé
ou destructible par la chaleur et, quoique fort indigeste,
elles servent dit-on d'aliment à la classe pauvre en
Egypte et en Italie. Elles ont été employées dans
l'antiquité comme vermifuges, propriété qu'elles tiennent
peut-être d'une huile amère qu'y avait découverte Fourcroy.
M. R. Bellini a trouvé dans ces graines un

principe toxique soluble dans l'eau paraissant agir
sur le cerveau. Il se borne à combler de ses vaisseaux
leur emploi comme remède est dangereux et qu'on ne
devrait les utiliser que comme parasiticide et résolvant.⁽¹⁾

L'école vétérinaire de Berlin attribue à cette
toxicité les diverses maladies du foin qui atteignent les
bœufs qui contiennent le lupin comme fourrage.

De même, en Angleterre, où les maladies
déterminées chez le bétail par l'usage de cette plante
ont pris le nom de 'maladie du lupin' (lupine sickness).
Les symptômes, d'après M. L. Davies ont quelque chose
de ceux de l'ictère et de l'empoisonnement par le
phosphore. Rarement les animaux atteints en guérissent.
L'action du poison se fait sentir sur la rate, les reins,
le cœur et les muscles. M. O. Keller a donné un procédé
pour détruire le principe nuisible de la plante sans
proscrire l'usage de celle-ci; mais ce procédé est si peu
pratique qu'il serait beaucoup plus simple de sup-
primer le lupin de l'alimentation fourragère.⁽²⁾

D'après M. Krocke qui prétend en avoir

(1) Journ. de Ph. et de Ch. an. 1878, t. XXVII, p. 661.

(2) Pharm. j. and Transact., an. 1884-85, t. 15, p. 446.

retiré plusieurs alcaloïdes, le principe toxique serait légèrement soluble dans l'eau pure ou acidulée, très-soluble et légèrement alcaline, insoluble dans l'éther, l'alcool, la glycérine (1).

D'un autre côté M. C. Arnold donne un procédé au moyen duquel il a isolé un principe vénéereux du lupin, principe auquel il donne le nom de Lupinotaxine et qui, dit-il, à des doses minimes même est, chez les animaux, un toxique empyrique. (2)

Enfin, dans son plus récent travail fait sur ce sujet, M. Beaumont en a obtenu un alcaloïde qu'il appelle Lupuline de formule $C^{42}H^{40}R^{2}O^4$, base forte et cristallisable qui déplace l'ammonium de son chlorure. Elle possède une grande causticité et ses combinaisons ~~possèdent~~ une grande amertume. Elle agit physiologiquement pour paralyser les centres nerveux. (3)

C'est peut-être sorti du cadre de ce travail que de parler ici de l'Indigo. On sait que cette matière colorante qui, d'après M. Schrenck se forme par dédoublement d'un glucoside particulier l'indicane ou Indigone et l'insiguerine, est un principe assez empyrique qui agit, en

(1) Journ. de Ph. et de Ch., an. 1882, t. VI, p. 203.

(2) ———— ibid. — an. 1883, t. VIII, p. 520.

(3) Pharm. j. and transact. an. 1884-85, t. I, p. 446.

son temps, préconise contre l'hystérie, l'épilepsie et comme
éménagogue.

On doit à M. L. Alvarez de connaître le méca-
nisme de ce doublement, qui est dû à un bacille
spécial ressemblant beaucoup au microbe de la pneumonie
et ayant cela de très-particulier que, comme ce dernier,
il est infectieux et détermine la mort plus ou moins
prompte des animaux auxquels on l'inocule. D'ailleurs,
par réciprocité, le microbe de la pneumonie agit comme
la bactérie indigène pour produire la fermentation
indigotique. (1)

§3. Hédyсарdes.

Dans cette tribu. Dans sous-partie l'Onobrychis
sativa si utile et si répandue comme fourrage et sous
purgatifs, l'albaghi maurorum ou albaghi à la main et
la Coronilla emerus L. (Coronille faux téné) nous en faisons que
signaler la Coronilla varia L. (Coronille variée) qui a été
réputée vénéneuse par quelques auteurs, ce qui est encore
controversé. Elle est cultivée dans les jardins; on prétend que

(1) Journ. de Ch. et de Ch. an. 1887, t. XVI, p. 414 et suiv.

c'est un bon drucétique.

Mais nous devons nous arrêter un peu sur la
Coronilla scorpioides H. tout nouvellement étudiée

La Coronilla scorpioides H. est une plante
qui croît surtout dans le midi et l'ouest de la France, où
elle est réputée dangereuse pour le montard. Les graines
sont très-amères, et quelques unes d'entre elles ayant été
observées dans le sébum provenant du moutage à l'orge
d'une brasserie, M. M. Schlagdenhauffen et Reeb en ont
puisé l'examen.

En 1887 d'abord, une étude sur l'huile de coronille
les amena à d'intéressantes réductions que nous ne
pourrions pas relater ici⁽¹⁾. Peu après en 1889, ils isolèrent et
étudièrent surtout au point de vue chimique le
principe tonique de la Coronilla scorpioides. Celui-ci
est un corps possédant les propriétés d'un glucoside, qu'ils
ont appelé Coronilline et auquel ils ont assigné la
formule $C^{22}H^{12}O^{10}$. C'est une poudre jaune pâle, très-
amère, soluble dans l'eau, l'alcool, l'acétone et l'éther
amylique, très-peu soluble dans le chloroforme et le tétrahydrofur.

(1) Sur l'huile de Coronille. Journ. de Ch. et de Ph., an. 1887, t. XV, p. 464.

La solution aqueuse, chauffée avec l'acide chlorhydrique étendue se double en glucose, accusé par le réactif cupro-potassique et en un produit présentant d'abord l'apparence de gouttelettes huileuses qui finissent par se précipiter et prendre la consistance d'une résine amorphe. M. M. Seligdenhauffen et Reeb appellent ce dernier composé la coronilleïne et lui donnent pour symbole $C^{16}H^{18}O^{14}$. Elle est, de même que la coronilline, sous forme d'une poudre jaune pâle; mais elle n'a aucune amertume, est insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool, l'acétone, le chloroforme. D'un autre côté, elle est diffère complètement au point de vue physiologique; car, tandis qu'elle n'exerce aucune action sur l'économie, en raison sans doute de sa insolubilité qui lui fait jouer le rôle d'un corps inertes la coronilline est, au contraire, un poison du cœur. ⁽¹⁾

§ 4 Viciés.

La *Vicia sativa* ~~cauperni~~ ou alcaloïde, la

(1) Les Nouv. Rem., Dec. 1879, p. 553 et Suir. Man 1889, p. 123.

vicine, isolé par M. Ritthausen, qui paraît admettre qu'elle renferme une certaine quantité d'amygdaline, car il a remarqué que sa poudre végale toujours, au contact de l'eau, l'odeur d'acide cyanhydrique. Mais cette plante ne doit point nous intéresser ici.

Les semences de diverses espèces de Lathyrus et en particulier de Lathyrus sativus sont connues depuis longtemps comme susceptibles de produire certains phénomènes d'intoxication chez l'homme et chez les herbivores qui s'en nourrissent, phénomènes auxquels on a donné le nom de Lathyrisme. M. Carl Arnold a essayé d'isoler le principe toxique, mais il n'a pu encore obtenir qu'une sorte de matière résineuse brune, riche en substances albuminoïdes qui contient certainement ce principe et qui, chez certains animaux, occasionne de l'ictère à la dose de 10 grammes. (1) En tous cas ce principe se détruit à une température peu élevée.

Le principe toxique de L. Abrus precatorius sous les semences (Pois à chapellet) sont si vantes aujourd'hui contre les ophthalmies chroniques, a donné lieu à d'ui

(1) Journ. de Ph. et de Ch. an. 1833, t. VIII, p. 266.

Herpauts recherches.

L'Abrus precatorius L. ou Jequirity est une liane qui croît aux Antilles, dans l'Inde, en Afrique et au Brésil où ses graines sont en usage populaire contre les ophthalmies. Les feuilles sont pinnées, généralement terminées par une soie. Les fleurs petites et roses sont disposées en grappes terminales ou axillaires. Toutes les parties de la plante sont mucosées et contiennent de la glycyrrhizine, ce qui lui a fait donner les noms de liane à Reiglette, Reiglette d'Amérique ou de l'Inde. Aussi emploie-t-on la racine dans ces contrées comme succédané de la Reiglette. La gousse est courte, oblongue-bicône, plan convexe, bivalve, et renferme quatre à six graines globuleuses-ovoïdes de la grosseur d'un petit pois, à testa dur, poli et brillant d'un beau rouge écarlate, avec une tache noire autour du hile. On les appelle aussi Pois d'Angole; elles servent dans l'Inde à faire des chapelets. Une description histologique on est donnée par M. W. Eichensioff.⁽¹⁾

(1) Thoms. Journ. and Transact., an. 1885-86, t. 14, p. 3 et suiv. an. 1886-87, t. 15, p. 176.

D'après M. M. Marzey et Massell, ces semences, sous la macération est si active sur la conjonctive et dans les veines, tout tout-à-fait inoffensives dans l'estomac et, quoique très-indigestes, servent même dans l'Inde et en Egypte de nourriture à la classe pauvre. On prétend aussi qu'elles préviennent la fécondité.

D'après ces expérimentateurs, 0.10 à 0.1/ centig. seulement de la poudre de ces semences, introduites sous la peau d'un bœuf et, déterminent la mort en quarante-six heures, avec production de microbes de diverses sortes à l'endroit de l'injection. Aussi, voit-on les habitants du Punjab en faire, après réduction en pâte, des espèces de cylindres pointus qu'ils introduisent, une fois secs, sous la peau du bétail pour l'empoisonner.⁽¹⁾

La macération de ces graines agit, dans les affections chroniques, pour produire une conjonctivite purulente spéciale, mais son emploi exige de grandes précautions, car parfois, l'intensité de son action est telle qu'elle peut déterminer une inflammation s'étendant à la face entière, au cou, et même à la partie supérieure du thorax.

(1) Pharm. journ. and transact. an 1886-87, t. 1, p. 483.¹⁸⁶⁵

En raison de cette propriété, ces graines ont été l'objet d'importants travaux de la part de différents auteurs afin de savoir si l'état inflammatoire était dû au microbe particulier que l'on voit toujours se développer dans la macération des semences de jiquiritia ou à un principe toxique spécial inconnu. Nous allons résumer ces travaux.

M. Wecker de Paris, le premier, obtint l'atténuation sur les propriétés de cette substance et attribua son action sur la conjonctive à un ferment soluble existant dans la graine.

Mais, M. le prof. Sattler d'Elmengen ayant découvert dans la macération un bacille en forme de bâtonnets mobiles, arriva à conclure, par des expériences sans doute mal exécutées, que ce bacille jiquiritique était l'agent pathogène en produit, que de plus il existait partout, mais ne pouvait normalement se développer que dans le sérum d'une macération de semences d'Abies.

D'un autre côté M. m. Cornil et Berthel, ayant tué des animaux par injection hypodermique de

cette macération, avec pullulation considérable de microbes
après la mort, on déduisait que cette ophthalmie pouvait
être assimilée au charbon aigu des mammifères, c'est-
à-dire qu'elle était infectieuse, et ils ne soupçonnaient
de même aucune substance toxique proprement dite.

Cependant, M. M. Mylants et Vermeulen
obtinrent au principe (jéquiritine) sorte de ferment non
organisé se dissolvant à la température de 30° . C'était,
disaient-ils, un corps anorphe, apote, dont l'action sur
la conjonctive était extrêmement violente.

M. Widmark oculiste suédois, reprenant les
expériences de M. Sattler et les complétant ne parvint
jamais à déterminer l'ophtalmie jéquiritique au moyen
d'une culture pure des bacilles, tandis qu'au contraire
il la produisait avec une macération dont les microbes
étaient préalablement détruits par l'acide phénique.
Il conclut alors que la substance agissait sur la
conjonctive ou sur la peau, à la façon d'un poison.

M. Klein (de Londres)⁽¹⁾, M. le prof. Rejfer (de
Mertan) conclurent encore que l'action de l'abus était due

(1) pharm. j. aut. trad. an. 1913-94, t. 14, p. 779.

à son ferment non organisé.

En même temps M. M. Salomonson et Dirkinck
(de Copenhague) faisaient aussi des expériences et des
dérivations absolument identiques: une macération de
jéquirity dans la glycérine où le microbe ne se
développe pas, est plus active, visent-ils, que la
macération aqueuse. N'ayant pu y déceler l'albumine,
ils furent amenés à admettre que le poison était dû à
un ferment inorganisé (jéquiritia de M. M. Brugsch
et Kunze) soluble, agissant à des doses extrêmement
petites et se plus détruit par la chaleur à 70°.

La théorie de M. Sattler tombait donc d'elle-
même et quant aux expériences de M. M. Cornil et
Berthé, M. M. Salomonson et Dirkinck montraient que
ce n'était qu'une apparence, due sans doute à ce
que leurs macérations étaient trop concentrées et,
s'ils étaient arrivés à donner la mort à des grenouilles
par inoculation, étant d'une première grenouille
introduite par la macération jéquiritique, cela tenait
à ce que l'excès de poison inoculé avait empoisonné

le sang lui-même de cette première génération et ce sang
était ainsi devenu toxique, mais non pas infectieux.

L'ophtalmie purulente causée par les semences
de *S. abrus pectoratus* est donc bien due à un principe toxique,
ferme, inorganisé et amorphe, soluble dans l'eau, destruc-
tible par la chaleur à la température de 20° , et non au
baille qui se développe toujours dans la macération de
ces semences et dont le rôle est encore inconnu. (1)

D'ailleurs plus récemment encore, M. M. Maréchal
et Wassellous ont isolé le poison du *Scorpion* arabe
ils donnent le nom d'abrine. C'est d'après eux un
corps amorphe et insipide, gris pâle, qu'ils obtiennent
en précipitant par l'alcool une solution aqueuse préparée
avec la poudre des grains et qui agitait à la façon du
venin des serpents. (2)

§5. Phascolées.

Nous avons à signaler dans cette tribu, des
végétaux très-intéressants au point de vue où nous nous
plaçons. Au même temps que des produits extrêmement

(1) Voir aussi: Pharm. j. and Transact. an. 1883-84, t. 14, p. 3 et suiv.; et Journ. de Ph. et de Ch.
an. 1884, t. XIII, p. 17 et suiv., 64 et suiv., 121 et suiv.

(2) Amer. j. of Ph. an. 1887 p. 3 et suiv. (Voir aussi même Journ. an. 1886, t. 16 p. 232.

venimeux, elle est, en somme, qui sont abstraites et de la plus grande importance : le *Strascolus vulgaris* en est le type.

Le *Citron de l'Inde*, *Citrona nemata* L. se fait remarquer par les propriétés émétiques énergiques de sa racine et l'action purgative de ses semences.

Le genre *Dolichos* possède des espèces nombreuses. La plupart donnent des racines ou plus souvent des graines comestibles dans leur pays de culture.

Cependant les graines des *Dolichos minimus* L. et *obtusifolius* Lam. sont vénéneuses. Le principe actif n'en a pas été étudié.

Quant aux *Dolichos virens* et *purpureus* L. appelés vulgairement *Pois à gratter* et dont les noms génériques aujourd'hui sont, pour le premier *Mucuna virens* DC. (*Loophthalmum virens* R.Br.). Grand pois poulleux, et pour le second *Mucuna purpurea* DC. (*Stizolobium purpureum* Des.) Petit pois poulleux ou pois à gratter, ils ne renferment aucune substance toxique. Si l'on traite les pois qui recouvrent leurs gousses par le distillant,

on n'obtient aucun résidu après évaporation du menstruel.

Ils sont constitués par une cellule unique, très-allongée en cône, dont la surface externe porte de distance en distance, surtout près de la pointe des épaissements en forme de courtes barbelures dirigées vers la base du poil. Leur ~~rigidité~~ rigidité et leur ténuité facilite leur pénétration dans les pores de l'épiderme et la disposition des petits appendices externes signalés plus haut, fait qu'ils tendent à s'y enfoncer de plus en plus. On prétend qu'on saisis de cette action toute mécanique ils peuvent être incorporés à du sirop ou à du miel et agir comme anthélmintiques; mais dans ce cas ne détermineront-ils pas sur les muqueuses un état inflammatoire dangereux?

D'ailleurs, ces poils ont été employés quelquefois, dans certains cas de choléra, pour ramener la chaleur à la surface du corps et on en a fait aussi la base d'une pommade antécuite, agissant comme résolvif à la façon de l'huile de croton.

La Glycine, telle plante si recherchée par

L'horticulture a été signalé en 1881 par le 'Boyer médical',
comme ayant occasionné un commencement d'empoisonne-
ment dans un pensionnat de demoiselles. Mais M. Sigier
et M. Rondeau ont fait des expériences avec la *Viscaria*
chinensis de Paris et des environs et ont trouvé cette
plante sous tous les rapports absolument inoffensive.
Le fait s'étant passé en Saône-et-Loire, il se pourrait
que l'espèce incriminée ne fut pas la même. (1)

Les semences de *Rhynchosia precatória* H.B.K.
qui font partie de la nouvelle pharmacopée mexicaine
sont considérés au Mexique par le vulgaire comme
susceptibles de faire perdre la mémoire. M. Altamirano
médecin à Mexico a expérimenté sur lui-même avec
leur extrait alcoolique et n'a rien ressenti sous ce
rapport. Cependant il est certain qu'un principe
toxique existe dans ces graines (2)

De tous les produits toxiques que peut
contenir la classe des Légumineuses, le plus important
à tous égards est la Fève de Calabar, fournie par
le *Phyostigma venenosum* Balf.

(1) Journ. de Ph. et de Ch. an. 1881, t. 11, p. 283

(2) Ann. j. of Ph. an. 1881, p. 433

L'importation en Europe de ce produit ne date
guère que de 1840, époque où le Dr Daniell qui
l'avait importé, signala le premier ses propriétés toxiques
et l'usage barbare qui en font les poisons des coutumes
où on le rencontre. Dans ces pays en effet, au Nieuw
Calabar principalement, cette graine sert de poison
d'épreuve dans les condamnations et les duels judiciaires.
On l'y connaît sous le nom d'Esère qui veut dire
fève d'épreuve. C'est un des poisons les plus redoutables
que la thérapeutique a su néanmoins transformer en
un médicament très-utile.

Le Thyostigma venenosum Balf. est une
plante qui croît en Afrique, au Nieuw Calabar, sur les
rives des bouches du Niger et des autres cours d'eau
qui se jettent dans le golfe de Biafra. C'est une
herbe vivace et ligneuse, grimpante, pouvant atteindre
de 10 à 20 mètres de longueur. Les feuilles sont trifoliales,
attornées, stipulées, à folioles ovales amincies, pithulées
et stipulées. Les inflorescences sont axillaires, en grappes
flexibles et pendantes. Tous les axes principaux sont

marqués de nœuds alternés et irréguliers sur chacun
desquels se trouvent, portés par des pédicelles, une ou
plusieurs magnifiques fleurs papilionacées, - grandes.
Le calice est à 5 dents subtriangulaires, courtes et obtuses.
La corolle, d'un rouge pourpre, est sillonnée de veines
jaune pâle. Les étamines sont diadelphes (9-1). Le
pistil, porté par une sorte de sigue en forme de
gaine crénelée sur ses bords, est allongé et se
prolonge en un style très long et deux fois recour-
bé, couvert de poils à sa face concave, tandis que le
stigmate en forme de croissant est fortement enflé, et
se prolonge en une sorte de capuchon. C'est ce qui a
fait donner à cette plante par le Prof. Balfour
d'Edinburgh, son nom générique. La gousse, très-
forcée, est glabre et légèrement falciforme, elliptique-
oblongue, un peu comprimée, de 0.05 à 0.20 centim.
de longueur. Elle contient généralement, au milieu
d'un tige un peu mou deux ou trois graines
uniformes de 0.02 à 0.03 de longueur et de 0.010 à
0.015 de largeur, dont le bord convexe est remarquable.

par un long hile linéaire, on forme d'une rainure
large d'environ 0.003, qui le parcourt entièrement.
L'épisperme est dur, coriace, carpat, de couleur brun
chocolat ou presque noir, très-légèrement chagriné
sur toute la surface, excepté sur le sillon formé par
le hile dont les bords très-net et saillants, sont
lisses, rayés ou brisés. Vers l'extrémité la plus grosse
de la graine, on voit une toute petite cavité, au fond
de laquelle aboutissait le micropyle.

Ce testa est formé de deux couches super-
posées de cellules à parois fortement épaissies et
garnies d'un tannin physiologique probablement
destiné à prévenir une trop prompte destruction de
l'épisperme. (fig. 1 et 2) La couche externe se compose de




Fig. 1
Coupe transversale du testa.



Fig. 2.
Coupe tangentielle de la
couche externe du testa
(cellules allongées
radiales).

cellules considérablement allongées dans le sens radial.

tris. séries et enchevêtrées les unes sous les autres :
 Dans cette première enveloppe on en voit une autre formée
 de cellules plus ou moins polyédriques et aussi tamponnées.
 Ces deux couches ont entre elles la plus grande
 adhérence. Vers la rainure du hile, la couche
 interne s'épaissit beaucoup (fig 3), de façon à



fig. 3.

Coupe transversale du testis vers le hile.

envelopper une sorte de cordon à section ovale formé
 de cellules réceptes particulières, qui va d'un bout à l'autre
 du hile. La couche externe est elle-même doublée, en
 cet endroit seulement, d'une seconde couche de structure
 presque identique, venant en quelque sorte se joindre
 la première dans les gouttières du hile (fig. 3).

L'amant est formé, entre l'embryon, de

Deux gros cotylédons durs, blancs et friables, que la dessiccation a fait se rétracter, de sorte qu'ils laissent entre eux un espace vide à peu près égal au tiers de l'épaisseur de la graine (fig. 4).



Fig. 4.
Coupe de la graine.

Ce sont ces cotylédons qui, presque exclusivement, contiennent le principe tonique de cette graine. Ils sont constitués par un parenchyme assez lâche sans les cellules, auquel on trouve une grande quantité d'amidon et d'aleurone. Ces grains d'amidon, très-bien caractérisés




Fig. 5.
Coupe du parenchyme
des cotylédons.

comme dans toutes les légumineuses par un hile allongé et des stries, sont de dimensions assez variables : entre 10 et 90 μ , plus souvent de 60 à 80 μ .

Le Dr. E. R. Fraser qui le premier en 1895 constata

les propriétés de l'extract de la fère sur liris, prétend que
seuls, les graines de cette plante sont actives, s'a fait
des essais avec la tige et n'en a obtenu que des résultats
négatifs.

La fère de Calabar est indolore et insipide.
C'est un poison du cœur dont elle détermine la paralysie.
Les effets s'annoncent d'abord par des tremblements,
une soif intense, l'affaiblissement musculaire, des
convulsions, une difficulté d'avaler et une abondante
salivation, puis l'irrégularité dans les battements du
cœur, la paralysie enfin. En conséquence de ces
effets, elle a été employée dans certaines affections
générales du système nerveux, telles que la chorée,
le tétanos. Comme ses effets physiologiques sont
inverses de ceux de la strychnine, elle a été admi-
nistrée parfois avec un succès relatif, dans des cas
d'empoisonnement par cette dernière substance.
Dans ces circonstances, on la donne à la dose de 0.07
à 0.15 Centig., en poudre, ou à celle de 0.07 à 0.10
millig. sous forme d'extract alcoolique. M. Christy

en 1855, a en effet montré par des expériences faites sur lui-même que c'est dans la solution alcoolique seule que se concentrent toutes ses propriétés actives.

Son emploi le plus général aujourd'hui résulte de son action sur la pupille que sa poudre, son extrait et les principes qu'on en a successivement retirés ont la propriété de contracter énergiquement. Cette action, inverse de celle de l'atropine, dont cette substance peut neutraliser les effets tandis que l'akalane de la Belladone ne saurait nullement atténuer les effets de produit en quelques minutes seulement et son maximum a lieu au bout d'environ trois-quarts d'heure. Il se produit alors une sorte de myopie artificielle.

Le principe dont la fève de Calabar tient cette propriété existe à la fois dans l'épisperme et dans les cotylédons; mais, d'après ce que nous avons remarqué, l'extrait obtenu avec ces derniers seuls possédait une énergie beaucoup plus considérable.

On a fait, dans ce but, un collyre

d'extract de fève de Calabar. Cet extract étant peu soluble dans l'eau et au contraire très-soluble dans la glycérine, on faisait une solution au $1/10^{\text{me}}$, $1/20^{\text{me}}$, $1/50^{\text{me}}$ etc. dans ce dernier véhicule. On employait cette solution soit en l'instillant directement dans l'œil, soit, ce qui valait mieux, on en imbibait de petites feuilles de papier vergé, que l'on découpait en petits carrés d'une grandeur déterminée, de façon à ce que chacun d'eux contint exactement deux milligrammes d'extract. Il suffisait alors d'en placer un entre le globe de l'œil et la paupière pour produire la myose. Quelque fois, ce papier calabarisé a été simplement fait au moyen de la teinture alcoolique des semences. On peut aussi le remplacer par des tablettes pelliculaires de gélatine contenant encore une quantité dosée de la solution d'extract.

M. M. Jobst et Herzog avaient d'abord annoncé avoir isolé de la fève de Calabar une acélide jaune brunâtre, amorphe et très-toxique, soluble dans l'eau légèrement salée. Ils avaient

donné le nom de Physostigmine ou Calabarine; mais
il a été reconnu depuis que cette substance, très-active
d'ailleurs, n'était en somme qu'un produit impur.

L'Esérine actuelle en est la préparation perfectionnée.

Cependant cette physostigmine avait donné
lieu à des études physiologiques-sérieuses de la part
de divers expérimentateurs. Ses propriétés, en réalité,
sont très-analogues à celles de l'Esérine, si ce n'est qu'elles
semblent être un peu atténuées. Comme l'Esérine, elle
est peu soluble dans l'eau, soluble au contraire dans
l'alcool, l'éther, le chloroforme.

Ses effets physiologiques sont de trois ordres:
1^o, sur la pupille; 2^o, sur les voies digestives et circula-
toires; 3^o, sur la partie inférieure de la moelle épinière.

Son effet sur la pupille consiste en son
rétrécissement qui est considérable; il en résulte
durant tout le temps que se produit son action une
augmentation des propriétés réfringentes du globe de
l'œil, d'où conséquemment une myopie plus ou moins
intense.

Dans le tube digestif, elle détermine des coliques, des vomissements et de la diarrhée et, pour ce qui est de son action sur la circulation, elle détruit la régularité des battements du cœur.

Enfin son effet nerveux se résume en une prostration extrême avec l'affaiblissement des extrémités inférieures. Il en est résulté son emploi comme antidote du tétanos et des empoisonnements par la strychnine; bien que, dans ce dernier cas, son efficacité ait été contestée.

L'isérine est aujourd'hui le seul produit qu'on retire de la fève de Calabar pour l'usage médical. Son l'emplâtre, soit telle qu'elle, soit même à l'état de sulfate, ou son bromure qui cristallise très-bien.

C'est en 1865 que M. M. Vée et Herxheim ont obtenu en traitant la graine du *Physostigma* par l'acide tartarique et le bicarbonate de potasse. Le Coussé de 1874 a simplement remplacé ce dernier par le bicarbonate de soude. C'est un alcoolide qui cristallise en aiguilles incolores d'abord, mais qui ne tardent pas à

devenir plus ou moins rosées, ce qui est dû à l'action
de l'oxygène de l'air et surtout des alcalis. L'essence
est très-peu amère, peu soluble dans l'eau, assez
cependant pour ramener au bleu le papier rouge
de tournesol, soluble dans l'alcool, l'éther, le chloroforme.
Sa composition est représentée par la formule $C^{12}H^{24}O^4$.

C'est une substance extrêmement toxique.
Absorbée par la conjonctive, elle peut déterminer la
mort: un peu plus d'un milligramme, injecté à la
surface de cette membrane déterminerait de très-grands
accidents.⁽¹⁾ Mais elle agit encore avec une rapidité
beaucoup plus grande lorsqu'elle est introduite dans
l'estomac. On l'utilise, au moyen de rétines ap-
propriées dans certaines maladies générales comme
l'épilepsie, le tétanos, la chorée.⁽²⁾

(1) Un journal anglais rapporte qu'en 1888 une dame de 60 ans eut les
symptômes d'empoisonnement pendant 4 jours, par suite de
l'intubation dans l'œil d'une goutte d'une solution de 0.06 centig pour 1 gram.
C'est-à-dire environ $\frac{3}{4}$ de milligr. d'essence. La solution ordonnée était de
0.06 pour 30 d'eau dist. (Les Nouv. Rem., 1888, p. 211)

(2) Ann. j. of Ph. an. 1888 p. 267.

Dans cette dernière affection, surtout, elle paraît
jouir d'une grande efficacité curative. D'après M. Riess
de Berlin, la guérison peut parfois en être obtenue en
cinq ou six jours ; quinze jours comme maximum.
Une injection hypodermique de 0.001 millig. répétée une
fois dans la journée suffit, dit-il, pour arriver à ce
remarquable résultat.

Mais cet alcaloïde est surtout employé pour
le resserrement de la pupille dans différentes affections
de l'œil. C'est le plus fort antagoniste de
l'atropine et, sous ce rapport, son action est incom-
parablement supérieure à celle de la digitale,
de la Santonine, de l'aconit, de l'opium ou de la
morphine. Il suffit d'instiller sous la paupière
quelques gouttes d'une solution au 1/500^{me} ou au 1/1000^{me}
de sulfate d'éserine pour obtenir l'effet qu'on désire.
On a fait l'essai il n'y a pas longtemps et on s'est
trouvé bien de l'emploi du bromure d'éserine. Il est
soluble aussi dans l'eau et possède les mêmes propriétés
que le sulfate et l'éserine elle-même. Il a de plus

comme avantage d'être absolument neutre, d'une conservation facile, et de ne jamais amener d'irritation locale.

En Amérique, le salicylate d'escérine (ou salicylate de phypostigmine) donne d'excellents résultats comme anesthésique local et antispasmodique énergique (Dose employée $\frac{1}{4}$ de millig. répétée une seconde fois à deux d'intervalle). Ce sel se présente en cristaux incolores ou légèrement jaunâtres, soluble dans 150 parties d'eau à 12 parties d'alcool. Il se conserve bien.

M. M. Harnack et Wilkorski en 1870 et M. Holmes en 1879 ont dit avoir retiré de la fève de Calabar, en outre de l'escérine, un second alcaloïde différent du premier, insoluble dans l'éther, qu'ils ont nommé calabarine et dont les symptômes toxiques sont réels par un létanos analogue à celui produit par la strychnine, sans contraction de la pupille; ce serait même un antagoniste de l'escérine! (1) Cet alcaloïde est mis en doute par M. Peter Mac Ewan et, pour lui, proviendrait de ce que tous les modes opératoires

(1) Journ. de Ph. et V. Ch., ann. 1878, t. XXVII, p. 291.

principaux employés pour préparer l'essence sont
défectueux.

On a voulu objecter que cet alcaloïde avait
été retiré d'une variété de fève de Calabar qui
n'aurait fait dans le commerce qu'une courte
apparition; mais il paraît qu'en Angleterre cette variété(?)
a continué, depuis l'annonce de la découverte de cette
calabarine, de se trouver mélangée à la fève
ordinaire.

En 1879 en effet, apparaît sur le marché pharma-
ceutique de Londres, une seconde sorte de fève mêlée
à la fève de Calabar ordinaire. M. Holmes trouva
au 'British museum' sous la rubrique mucuna cylin-
droperma une graine absolument semblable à ce
produit nouveau; mais, comme il lui paraît évident que
cette semence ne pourrait pas provenir d'un mucuna,
il la désigna sous le nom de Hypostigma cylindropermum.
Ces semences sont plus longues et plus cylindriques que
les autres. Mais le caractère différentiel le plus important
entre les deux, consiste en ce que le hile de la fève cy-

l'indurique ne s'étend pas comme chez l'autre jusqu'au point où la place du micropyle est visible, mais s'arrête à environ un quart de pouce de là.

Dans autre côté, si l'on examine une certaine quantité de fibres de Calabar, on remarque parfois qu'elles sont de dimensions et de couleurs différentes; les unes violet noir, les autres de couleur brun-rose. Cela tient probablement à ce que les premières sont complètement mures, tandis que les secondes ont sans doute été récoltées avant leur maturité entière. Cette différence de maturité a été suggérée comme un indice de la différence d'énergie qui existe entre la calabarine obtenue par M. M. Holmes-Harnack et Wilkowski et l'ésérine.

Ces expérimentateurs avaient alors opéré avec les semences non encore mures. Et en effet, cette particularité que les mêmes indigènes du Calabar savent choisir pour certains de leurs favoris, des semences inoffensives parmi leurs frères d'épreuve, semblent être encore un argument en faveur de l'existence de la calabarine. Enfin, M. Mac Ewan écrit encore l'année


que cette calabarine ne serait qu'un produit modifié de l'ésérine, obtenu sans doute de drogues (extraits ou semences) ayant séjourné longtemps en réserve. Pour appuyer cette opinion, il dit avoir fait des expériences, séparément avec les variétés rouge, noire et longue et n'en avoir jamais obtenu qu'un seul et même produit.⁽¹⁾

Cependant, au milieu de toutes ces divergences, si l'on compare à la Calabarine dont il est parlé ci-dessus, le produit tout récemment et nettement obtenu par M. M. Böhringer et fils de Mannheim, on est presque tenté de croire que cette calabarine était bien réellement un produit à différence de l'ésérine, produit sans doute alors impur et jouant vis-à-vis du produit nouvellement découvert par M. M. Böhringer et fils le même rôle qu'avait joué d'abord la physostigmine de M. M. Jost et Herp vis-à-vis de l'ésérine de M. M. Vêl et Leroy.

M. M. Böhringer et fils de Mannheim ont en effet retiré de la fève de Calabar un nouvel alcaloïde, ayant chimiquement beaucoup de rapports avec l'ésérine ou physostigmine. Ils l'ont appelé Eséridine. Elle ne

(1) Thom. J. aut. trans., an. 1886-87, t. 17, p. 641 -

Diffère dans sa composition de l'ésérine que parce qu'elle possède en plus les éléments de l'eau :



Chauffé avec les acides, l'ésérine se transforme en ésérine. Elle cristallise facilement et forme des sels avec difficulté, au contraire de l'ésérine qui cristallise avec beaucoup de difficulté et donne des sels bien cristallisés. C'est un poison moins actif que cette dernière, dont la dose toxique est dix fois moins forte.

Cette ésérine a une action puissante sur l'intestin. Son emploi détermine d'abondantes évacuations alvines, et elle n'affecte pas les centres nerveux à un aussi haut degré que l'ésérine. Son action sur la moelle épinière est analogue à celle de la strychnine sans production d'effet cumulatif. Les particularités semblent assez indiquer qu'elle ne diffère peut-être pas de la calabarine de M. M. Harnack et Wilkowsky, qui, d'après eux, était le principe tétrahydro de la fève de Calabar. ⁽¹⁾

(1) The Chemist and Druggist of London, an. 1898, t. XXXIII, p. 515.

Nous avons encore à signaler dans la tribu
des Phacéliées une substance étudiée en 1881 par M.
Dochefontaine et Rey; c'est l'écorce de Erythrina
corallo-dendron (*Erythrina crista galli* L.: Ecorce de Moulougué).
grand arbre du nord du Brésil, utilisé communément
dans ce pays comme calmant et hypnotique.

Des échantillons de cette écorce et de son
extrait ont été rapportés du Brésil par M. Rey sous
le nom d'écorce de Moulougué et ici nous rappellerons en
passant sans en tirer de conséquences, que récemment
en 1887 M. Ferreira a rapporté cette écorce de
Moulougué au *Piscidia erythrina* dont il est parlé
plus loin (Dalbergiacées).

Son principe actif, que M. M. Dochefontaine
et Rey disent être un alcaloïde qu'ils désignent
sous le nom d'Erythrine, paraît agir pour abolir
le fonctionnement du système nerveux central et
déterminer une paralysie momentanée du cœur.
D'une autre côté, les expériences de M. M. Pinet et
Dupré, semblent le désigner comme un poison du cœur.

En 1884, à l'exposition de Rome figurait une
liasse sous le nom d' *Erythrina mulungu* Benth, qu'on
annonçait avoir des propriétés sédatives et narcotiques
et qui doit être raisonnablement rapportée à cette
même plante dont il est parlé précédemment.

Les semences de cet *Erythrina corallodendron*,
que l'on trouve dans la flore mexicaine sous le nom
d'*Erythrina coralloides* et qui ont valu son nom à la
plante, sont elliptiques, polies, brillantes, d'un rouge
corail, avec une ligne longitudinale saillante sur
le dos et un file blanc, bordé de noir.

Ces semences sont très-vénéreuses. L'analyse
en a été faite par M. Rio de la Liza. Elles contiennent
un alcaloïde (!)

Le journal de Pharmacie de Philadelphie signale
deux variétés dans le Lois d'Achery, *Phaseolus linatus* L.,
sorte de haricot, cultivé et utilisé parfois comme aliment
par les créoles de l'île Maurice. Les deux variétés ne
présentent, paraît-il, aucun caractère défini permettant
de les distinguer, si ce n'est dans les graines dont

(1) Journ. de Ph. et de Ch., an. 1881, t. III, p. 451 — Ann. J. of Ph., an. 1884, p. 626; an. 1885, p. 431.
— Les Nouv. Rem., an. 1886, p. 412.

l'une les a blanches, c'est la variété comestible, et l'autre qui les présente diversément variolées, ce sont celles-ci qui sont vénéreuses.

D'après M. M. Davidson et Stevenson, leur toxicité serait due à l'acide cyanhydrique qui se forme, lorsqu'on les met à macérer dans l'eau, par un procédé analogue à celui qu'on observe pour les amandes amères et le laurier-cerise. (1)

§ 6. Dalbergiées.

La tribu des Dalbergiées fournit à la matière médicale le genre important *Stereospermum* où se trouve le *Kino* officinal.

Elle renferme aussi une plante, le *Discidia* *erythrina* Lam. présentant des propriétés chirurgicales remarquables et qui, jusqu'ici, était restée à peu près sans applications en Europe. C'est un arbuste des Antilles qui doit son nom aux effets narcotiques qu'il produit sur les poissons ses écailles, et à la couleur rouge éclatante de ses fleurs.

(1) Amer. J. of Ph. med. 1884, p. 451.

On trouve aujourd'hui l'écorce de cet arbre dans le commerce. Celle-ci se présente sous sa forme d'écorce, qui est de couleur marron ou gris sale à aspect terneux; elle est dure, fibreuse, disposée en feuillets minces, à surface interne plus ou moins brune, à cassure gris clair; elle est inodore, à peu près insipide tout d'abord, mais faisant ensuite subsister assez longtemps une légère sensation de chaleur sur la langue et surtout de nausée dans l'arrière gorge.

Depuis fort longtemps aux Antilles, le *Baccharis eriphaea* est connu sous les noms de Bois enivrant, Bois de chien (Dog Wood) et les naturels s'en servent à la façon de la Coque du Levant pour étourdir les poissons et pour imprégner les flèches avec lesquelles ils chassent, après de s'être pûs les uns aux autres. Ceux-ci n'en deviennent pas pour cela vénéneux à manger, probablement à cause de la volatilité du principe toxique par la cuisson. Il en résulte cependant parfois parait-il des inconvenients.

Le Dr. Hamilton de Plymouth, le premier

En 1844 ayant remarqué son puissant effet narcotique sur
les puérils, avait fait des essais sur lui-même pour
celui des névralgies dentaires. Une toux au genre
qu'il utilisa d'abord en frictions ne lui donna aucun
résultat; mais, en ayant absorbé quatre grammes avant
de se coucher, il eut un profond sommeil pendant
dix heures. A son réveil la douleur avait disparu
sans qu'il fût incommodé par l'emploi de ce
médicament, comme on l'est souvent lorsqu'on se
sert des opiacés.

Plusieurs médecins américains, (le Dr Ott avec
lequel de la racine), sont arrivés à des conclusions
semblables.

Le Dr. Hayes entre autres, admet que ce
médicament a tous les avantages du *Opium* sans
en avoir les inconvénients. Il a employé un extrait
fluide et une teinture alcoolique de l'écorce de
Piscidia erythrina à des doses variant de 2 à 4 et
6 grammes dans les 24 heures et il a pu constater que
c'est un hypnotique puissant et un analgésique

produisant d'excellents résultats dans les cas de
névralgies chroniques ou autres, de douleurs de ventre
et d'indigestions; de toux persistante, la toux des
phthisiques en particulier jamais l'un produit de
nausées, jamais de troubles digestifs. Généralement
il fait dormir et calme le système nerveux, et
il ne détruit pas toujours la douleur, il la
diminue du moins d'une façon sensible. C'est
ainsi que le Dr. Mayes rapporte encore que dans plu-
sieurs cas d'accouchements laborieux, sans effacer
les douleurs utiles, il a néanmoins procuré le
sommeil ou tout au moins atténué les douleurs
dans les intervalles de crises, sans produire aucune
complication. Son emploi est facile, la dose de cette
teinture pouvant sans danger être portée jusqu'à
1/2 grammes.

En France M. Dujaudon Beaumetz qui en
a fait l'essai, arrive à peu près à des conclusions
analogues.

M. le Dr. Ferreira croit servir identique.

cette écorce avec une substance depuis fort longtemps
employée au Brésil sous le nom d'écorce de Mulungu (!)
comme médicament sédatif. Mais cette écorce de
Mulungu ne doit pas être, croyons-nous, confondue
avec celle du *Piscidia erythraea*. L'aspect en est si
différent, qu'il n'est guère possible d'admettre qu'elle
puisse provenir de la même plante.

M. Edm. Harl a, en 1884, retiré du *Piscidia*
erythraea son principe actif, la Piscidine. C'est un
alcaloïde cristallisable qu'il prépare en mélangeant
50 grammes d'extract fluide et 40 grammes de chaux vive
préalablement stérilisée et laissant digérer une demi-
heure. On filtre et on ajoute à la liqueur de l'eau
purifiée, ce qui se produit un léger trouble; au
bout de deux à trois jours, la piscidine cristallise,
si on ajoute une nouvelle quantité d'eau, de nouvelles
cristaux se séparent. On purifie ces cristaux dans
l'alcool, la piscidine a pour formule $C_{52}H_{42}O_{16}$,
à son état pur elle est presque incolore, fusible à 192° , rési-
duelle dans l'eau, peu soluble dans l'alcool froid et

(1) Journ. de Ph. et de Ch., an. 1887, t. xv, p. 467.

l'éther, très soluble dans l'alcool bouillant, la benzine
et le chloroforme. Sa solution alcoolique est active sur
papier réactif. (1)

La Geoffrèe de la Jamaïque (Bois palmiste)
est l'Andira inermis H. B. K. (Geoffroya inermis L.), arbre
qui croît au Mexique, aux Antilles, et surtout à la Jamaïque.
Son écorce, comme depuis le milieu du XVIII^m siècle a
été, jusqu'ici très-peu utilisée. Elle est à peu près insi-
pide, à odeur faible, en morceaux aplatis ou en pec-
roules de deux à trois millimètres d'épaisseur. Elle est
de couleur gris blanchâtre ou rose plus ou moins foncé
si le péricarpe manque, gris ou parfois rougeâtre à
l'intérieur, à texture peu tenace, quoique fibreuse. Elle
semble contenir un tannin particulier avec des principes
actifs, un glucoside, l'andirine qui ne doit pas être
confondue avec l'andirine extraite par Beckolt de
l'Andira anthelmintica et qui est un glucoside.

Cette écorce est anthelmintique à la dose de
0.01 à 0.10 centig. seulement. Deux grammes sont suffisants
pour frapper violemment une personne adulte, l'infir-

(1) Journ. de Ph. et de Ch., an. 1814, t. 18, p. 41 et t. 2, p. 212, 213 - an. 1853, t. 41, p. 517 -
Les Nouv. Rem., an. 1831, p. 297 - an. 1846, p. 31 - an. 1837, p. 93 - Amer. J. of Ph. an. 1838
p. 439.

à haute dose, elle déterminerait des vomissements avec
éjections liquides et violentes cholériques, fébrile, etc..
b, la racine aussi narcotique. Elle jouit d'une toxicité
relative très-marquée.

Cette racine est utilisée depuis fort longtemps
aux Antilles, surtout sous forme de décoctions. Elle y
jouit d'une grande réputation comme vermifuge. On procède
par petites doses jusqu'à ce qu'on soit arrivé à provoquer
des nausées; (poudre f. s.; extrait à l'alcool.).

Hattenröschmidt en 1824 en a retiré un
alcaloïde cristallisable, brunâtre qu'il a appelé jamaïcine
(audrine de Beckolt) et qui est sans doute le principe
vermifuge de cette racine. C'est le même alcaloïde que
Castell en 1826 avait déjà identifié avec la berbérine.

Le bois de Pandora inermis contient une
résine amère qui paraît être le principe drastique de
la plante et qu'on retrouve aussi dans les semences,
appelées au Brésil sous le nom d'angelim amargosa.

Enfin la racine de cet andria est aussi une
puissante antihémorrhagique et outre sensiblement narcotique⁽¹⁾.

(1) Ann. f. of ph., an. 1838, p. 138-139 f. 2. de Ch. an. 1826, t. XXII, p. 49. etc.

La Geoffrèe de Surinam, Andira Surina-
mensis DC. fournit une écorce très-employée dans la
thérapeutique américaine. Elle diffère de l'écorce de
la Jamaïque en ce qu'elle est amère, astringente,
et de couleur plus foncée. C'est encore un narcotico-
saccharin, vermifuge à la dose de 0.10 centigr. à 1 gram.
à plus haute dose elle est de même émétique.

On désigne sous le nom d'Angelin,
(angelina, angelin ou semences d'angelin), les fruits ou plutôt
l'amande des fruits de plusieurs andira (andira
rosa Benth., A. anthelmintica Benth., A. vermifuga Mart., A. Hipuracea (Sw.) DC.)

Les fruits sont ovaires, charnus d'abord,
puis en séchant ligneux; ils contiennent une seule
graine très-chargée d'amidon, blanche intérieurement.

Les graines contiennent en principe très-
rare auquel elles doivent cette action anthelmintique
qui leur a valu, dans certains pays, une réputation
remarquable. Cependant, on ne doit pas oublier qu'à
la dose de 1^{re} 20 déjà, elles sont émétiques; à
dose plus forte il en est permis de les suspecter. A

Dose d'essai elles seraient dangereuses.

Rekoll en 1858 en a obtenu l'Andirina
alkaloïde qui paraît être identique à la
jamaïcaine.⁽¹⁾

Enfin l'Andira araroba fournit
une poudre brune et insipide appelée Poudre de
Goa (Poudre d'araroba ou d'arariba), dont l'origine
était restée jusqu'à ces derniers temps assez obscure.
Cette poudre vient du Brésil. On l'a attribuée
alternativement à un liège, ou à des concréétions,
formées sur la moelle de quelques légumineux et
M. Bailly la donne comme provenant simplement
de la pulvérisation du bois de l'Andira araroba.

Il paraît évident aujourd'hui qu'elle
proviendrait de la plante ci-dessus, grand arbre droit
et lisse de 20 à 30 mètres de hauteur, habitant
les lieux humides des forêts de la province de
Bahia. On l'appelle parfois angelim amer, nom
aussi donné, par confusion sans doute, aux semences
purgatives de l'Andira inermis, (angelim amargoso). La

(1) Ann. J. of ph. et. 1858, p. 558.

pourvu de trouver dans des fentes nombreuses existant
dans le bois du tronc, on l'extrait en fendant le bois
et grattant les surfaces des fentes pour les détacher.

M. Atfield admet d'abord que cette poudre
contient environ 84 p. 100 d'acide chrysophanique,
auquel on attribuait alors les propriétés purgatives de
la substance. Mais, ainsi que nous le démontrèrent M. M.
Liebermann & Seidler, l'acide chrysophanique n'y
présente pas, ou du moins n'y tient qu'une
très-petite quantité,
mais on y trouve en grande proportion de la
chrysarobine ($C_{10}H_{10}O_{14}$) qui, par oxydation directe,
donne facilement de l'acide chrysophanique ($C_{10}H_{10}O_{15}$).
La Poudre de Goa constitue le meilleur produit pour
obtenir cet acide dont M. Petit a donné le moyen
de préparation.

Cette drogue est surtout employée avec
succès sous forme de pommade pour le traitement
ou préventif, de l'herpès tonsurant et autres
maladies de la peau. (1)

(1) J. de ph. et de ch., an. 1830, t. I p. 53. — an. 1837, t. XI, p. 500 et suiv.

§ 7. Mimosaées.

Au point de vue de la matière médicale, ce groupe est des plus importants. C'est lui qui nous fournit les Gommés arabique, du Sénégal et autres analogues, désignées plus spécialement sous la dénomination de gommés solubles; l'or. Cachou et diverses autres espèces du genre *acacia* toutes antroymentes en fait encore partie. On y voit aussi un anthelminthique, l'*albizzia* ou écorce de *Mussaena*.

Les *Erythrophloeum*, classés autrefois dans cette tribu, doivent être plutôt rangés dans le groupe des Caspiées.

Nous y notons seulement en passant une plante d'Australie, l'*acacia delibrata*, que le Dr. Bancroft a examinée et dont le testa des graines lui a fourni un principe actif agissant comme un poison irritant, très-désagréable au goût, soluble dans l'eau et l'alcool.⁽¹⁾

(1) Pharm. j. and trans., an. 1837-38, t. 18, p. 278.

§ 8. Cassiées.

Cette tribu fournit à la pharmacie une grande quantité de produits de propriétés diverses ; en général des purgatifs. Le Campêche, le Coprahin, le Copal en font parties.

Les Sénés sont en, a attribué les propriétés purgatives à une substance appelée successivement cathartine, acide chrysophanique, acide cathartique, avaint pour principe, d'après M. M. Ferrielle et Laspargne un composé incristallisable, à saveur âcre et amère peu intense un ensemble de caractères un peu analogues à ceux de la apisine du *Cytisus laburnum*. Ce principe n'a pas été étudié au point de vue toxique ; mais M. Ralph. Stockman et parvenant à isoler du Séné une matière colloïdale jaune, jouant le rôle d'un glucoside, qu'il considère comme formé d'un mélange d'un dérivé de l'antraquinone et d'un hydrate de carbone colloïdale. Il l'appelle acide cathartique. Si, dit-il, on neutralise exactement cet acide par le carbonate de soude, on

obtient un sel, toxique à dose élevée qui, chez le
lapin par exemple, détermine au bout d'un jour une
fièvre avec violente diarrhée et qui tue l'animal en
l'espace de 2 à 3 heures. (1)

D'ailleurs, ce principe n'a pas été étudié
autrement, sa toxicité est relative et nous n'avons
pas ici à nous occuper des empoisonnements accidentels
auxquels ont pu donner lieu les sévés, lorsqu'ils ont
été mélangés avec les feuilles si vénéneuses du Redoul
(Coriaria myrtifolia L.) ou autres.

Le Cassia absus L. a récemment attiré
l'attention en Amérique par ses graines connues
sous les noms de chichery ou schimsch (en Europe
sontey cioma), dont la poudre mélangée à du sucre
et parfois additionnée de curcuma est dit-on
très efficace sous forme de collyre se contre la
Conjonctivite granuleuse.

On pourrait suspecter la Poinciade,
Caesalpinia pulcherrima Sw., Poinciana pulcherrima Lam.,
tonique, stimulant et emménagogue actif. On prétend

(1) Amer. J. of ph. Jan 1887, p. 256 et suiv.

que l'infusion des feuilles est abortive, et qu'elle purge
violamment à la façon de Séné. ⁽¹⁾

On remarque encore dans cette tribu
le Gynnocladus dioica HBK. ou Chicot du Canada
(*G. Canadensis* Lamk, *Guilandina dioica* L.). C'est un grand et bel
arbre de l'Amérique du Nord à feuilles alternes bipennées,
à fleurs rosées et odorantes. La gousse, comprimée,
pulpeuse, contient des graines qui, torréfiées, peuvent à la
rigueur remplacer le café; aussi les appelle-t-on "coffee bean"
et l'arbre lui-même "coffee tree". C'est cependant un poison
stupéfiant relativement actif étudié très-récemment
par M. Bartholom de Philadelphie. Son principe actif
semblerait être un anesthésique général amenant une
diminution du nombre des battements du cœur.

Enfin, nous rencontrons ici un autre
poison du cœur des plus violents fourni par deux arb.
originaux de l'Afrique tropicale, l'Erythrophloeum
guineense Don et le Detarium senegalense Guill.
L'écorce de premier est connue sous le nom de Eéli, celle
du Detarium sous celui de Méli. Ces écorces ont entre elles

(1) Baillon, Bot. médie, 1833, p. 519.

la plus grande ressemblance, et les indigènes les confondent souvent.

L'Erythrophloeum guineense Don (Filiæ
succulentæ Guill. & Per.) est un arbre à feuilles alternes bipinnées,
à folioles coriaces et peu nombreuses, à fleurs diphyses en
grappes ramifiées à l'extrémité des rameaux. Le fruit
est une gousse longue aplatie, coriace et bivalve,
contenant, au milieu d'une pulpe, des graines à
embryon charnu et à albumen épais et durci.

Les écorces de ces deux plantes fournissent
une infusion de couleur bruy rougeâtre qui, lorsqu'elle
est concentrée, est employée par les naturels de la
province africaine du Loango et de la Nigérie
gambie pour empoisonner les flèches. L'Erythrophloeum,
principalement est réservé comme liqueur d'épreuve;
il sert aussi au tannage de certaines peaux recheschées.
L'infusion ci-dessus est connue sous le nom de
suc de Mangone ou Bourane. Chez le patient auquel
le hasard ou la cruauté du maître a destiné une
infusion concentrée de la substance, le principe

toxique agit avec une extrême violence, il tombe comme suffoqué: il est déclaré coupable. Moins chargée, la liqueur ne détermine pas d'aussi dangereux accidents. Dans les duels judiciaires les deux plaideurs ont subi le poison et, le plus généralement aucun d'eux ne résiste au poison.

Dans le commerce on trouve l'écorce de Mançône (Ecorce de Saffi; écorce de Boudou ou Boudou, aussi tree bark, casca bark). Elle arrive en morceaux aplatis ou légèrement convexes, irréguliers, devenant d'un épais, d'une couleur brun rougeâtre; sa face externe brune, rugueuse et couverte de végétations lichénisées. Elle est dure, fibreuse, inodore; lorsqu'on la pulvérise elle détermine de violents étourdissements. Elle est faiblement amère, non astringente tout d'abord, mais après quelques minutes apparaît sur la langue une sensation de brûlure avec diminution de la sensibilité tactile. Cette écorce est extrêmement vénéneuse. A dose toxique, elle produit de l'émoussement, en même temps que la pupille se contracte; les mouvements du cœur sont troublés, la respiration semble

arrêtée. Puis survenant des convulsions générales,
ensuivant dilatation soudaine des pupilles et la
mort par arrêt du cœur.

Le principe actif réside surtout dans le
tissu parenchymateux; c'est l'érythroplacine, isolée
par M. M. Hardy et Galois et avec laquelle des essais
physiologiques ont été faits par M. M. Rochefort et
G. Sé.

Elle s'obtient en épuisant l'écorce pulvérisée
par plusieurs macérations dans l'alcool à 60° légère-
ment acidulé par l'acide chlorhydrique, distillant pour
enlever l'alcool et évaporant à basse température ou dans
le vide. On obtient ainsi un extrait rouge brun qu'on
repasse par l'eau tiède, on filtre, on évapore au bain-
marie, puis après décantation on sature par l'ammoniaque
et on traite la liqueur par quatre ou cinq fois son volume
d'éther acétique qu'on décante dans un entonnoir à
robinet et qu'on filtre. On évapore à basse température
au bain marie, on a alors un résidu jaunâtre qu'on
repasse à plusieurs fois par l'eau distillée froide. Cette

devenue soluble est évaporée dans le vide et abandonnée à l'air cristallise et incolore. Celui-ci est soluble dans l'eau et l'éther acétique, insoluble dans l'éther, le chloroforme et la benzine; il forme des sels avec les acides.

C'est un poison violent, soit qu'on l'introduise dans les voies digestives, soit surtout lorsqu'on l'injecte sous la peau. D'après M. M. Rochefontaine et G. si l'on agit sur le cœur et l'appareil respiratoire on peut cependant l'employer à l'indication comme calmant dans certaines maladies du cœur. La dose maxima de chlorhydrate d'erythroplacine estalors de 0.01 en une seule fois, ou 0.03 dans les 24 heures. Son action dans ce sens se rapproche de celle de la Digitaline. En outre et de même que cette dernière il contracte énergiquement la pupille et l'action purgative, paraît-il, persiste pendant 24 heures. La teinture alcoolique de l'écorce simplifiée à la dose de 4 à 8 gouttes.

Il en arrive dans le commerce dans ces

Deuxième année, sous le nom de Haya, on mélange qui
semble formé en grande partie de deux substances différentes,
toutes deux solubles dans l'eau, l'une amorphe, très-
noire à cassure bruy verdâtre, l'autre ressemblant assez
à l'alcois caballay. On y trouve aussi des matières miné-
rales et quelques menus fragments d'une écorce que
M. Lervig croit devoir rapporter à l'Erythrophloeum grima-
reux, tandis que M. Estel l'attribue à un autre Erythro-
phloeum qu'il nomme judiciaire, pour rappeler l'usage
spécial qu'on en fait dans l'ouest de l'Afrique.
Il a d'ailleurs obtenu de ce Haya une sorte de principe actif
impur avec lequel il a fait des expériences physiologiques
qui le mènent à des résultats absolument analogues à
ceux qu'il a obtenus avec l'erythrophloeine et qui
semblent devoir confirmer son opinion sur l'origine
de cette substance.

Cependant, cette origine est contestée par M.
Liebreich qui prétend que cette substance serait le venin
du cobra, dont l'un des noms est justement, parait-il,
Naja Haya. Les fragments d'écorce ne seraient alors que des

impuretés. M. Lemm prétend au contraire que son
moyen lui vient de M. J. Hay marchand à Aden.

Quoiqu'il en soit, le chlorhydrate d'érythro-
phlaéine purifié, d'après le Dr Lemm se présente avec
des réactions très-énergiques, dont l'intensité peut, paraît-
il, se prolonger très-longtemps. D'autre part le Dr
Compeau Hay en a servi pour exciter plusieurs opé-
rations de cataracte. L'insensibilité oculaire peut
persister durant une heure et se localiser sur la
cornée, à l'exclusion de la conjonctive et des pa-
pières. Ses effets auraient donc quelque analogie
avec ceux de la cocaïne, mais celle-ci paraît enco-
re plus à même de conserver la priorité. (1)

M. Bailly signale un *Erythrophlaeum*
qu'il nomme *Courninga*, et qu'il dit avoir trouvé parmi
les plantes de Madagascar, dans lequel M. M. Gallot
et Hardy ont découvert un principe analogue à l'érythro-
phlaéine. C'est un arbre d'une vingtaine de mètres
hauteur, à feuilles bipennées pinnées, de grandes folioles
ovales. Les naturels l'appellent *Courninga*. La gomme

(1) J. de ph. et de ch., an. 1880, t. 2, p. 388 - an. 1889, p. 224.
Les Nouv. Rem., an. 1891, p. 224, 292 - an. 1893, p. 225, 281.

noirâtre et longue d'environ 0.20 centim., renferme des grains tout-à-fait analogues, paraît d'ailleurs se distinguer d'*Abrophaea quinquev.* (1)

On trouve donc parmi les Légumineuses un assez grand nombre de produits toxiques. Les poisons de ceux y sont en majorité, mais leurs symptômes sont variés. Les deux principaux parmi ces derniers, l'ésérine et l'orythra. L'ésérine agit en outre avec énergie sur la pupille pour la contracter. Le principe des Cytises paraît produire son action sur le système respiratoire et celui des Lupins semble agir lentement sur le cerveau.

Deux produits surtout de cette famille ont acquis en peu de temps un rôle prépondérant. Ce sont l'ésérine et la spartéine. Il en est de même pour leurs sels. Ils sont maintenant d'un usage courant. Les autres sont d'un emploi très-rare ou même n'ont donné lieu à aucun essai clinique. Cependant, pour beaucoup d'autres, des expériences physiologiques ont fait ressortir des propriétés spéciales, qui en feront sans doute utiliser.

(1) Baillon, Bot. méd. 1885, p. 624.

plusieurs avant peu de temps en thérapeutiques

Plusieurs autres plantes Légumineuses que
nous pourrions citer fournissent encore de propriétés plus
ou moins torigues. Mais leur étude n'est encore que-
très peu avancée ou nulle. et l'on ne saurait actuelle-
ment s'y tenir qu'à celles dont les travaux ont
donné lieu à des résultats absolument positifs.

Goubron

les

st

t

